

# ONE PACKS

Dispenser-Free Control Systems®

**Pathostat 64**

EPA Reg. No. 10324-154-3640  
EPA Est. No. 3640-WI-1

**#2343025**

**Cleaner, Disinfectant, Non-Food Contact Sanitizer,  
Deodorizer, Fungicide, Mildewstat, Virucide\***



### FIRST AID

In case of emergency, call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

**IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.


**IF ON SKIN:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

**IF SWALLOWED:** Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.

**IF INHALED:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.

**NOTE TO PHYSICIAN:** Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

### DIRECTIONS



#### **For Use as a General, Hospital Disinfectant, Fungicide, Virucide\*, Cleaner**

1. Pre-clean heavily soiled areas.
2. Apply use solution of 4 oz. of this products per 2 gallons of water (or equivalent use dilution) to disinfect hard, non-porous, non-food contact surfaces with a sponge, brush, cloth, mop, by immersion, auto scrubber, mechanical spray device, hand pump, coarse trigger spray device. For spray applications, spray 6-8 inches from surface. Do not breathe spray.
3. Treated surfaces must remain visibly wet for 2 minutes to kill SARS-CoV-2 or for 10 minutes to kill all organisms listed on the label.
4. Allow to air dry.
5. Prepare a fresh solution daily or when visibly dirty

**For Scrubbing.** Fill bucket with 2 gallons of water. Add contents of one pack to the bucket. Apply to surfaces with cloth. Wipe dry.

**For Floor Cleaning.** Fill mop bucket with 2 gallons level with water. Add contents of one pack into the mop bucket. Apply mopping solution to floor. Mop up solution or squeegee down drain. Repeat and rinse as necessary to remove residue.



**STEARNS PACKAGING CORPORATION**

4200 Sycamore Avenue (53714) • P.O. Box 14495, Madison, Wisconsin 53708  
Telephone: (800) 655-5008 • (608) 246-5150 • Fax: (608) 246-5149  
E-mail: [stearns@stearnspkg.com](mailto:stearns@stearnspkg.com) • [www.stearnspkg.com](http://www.stearnspkg.com)

Rev. 0923

# ONE PACKS

Dispenser-Free Control Systems®

**Pathostat 64**

EPA Reg. No. 10324-154-3640  
EPA Est. No. 3640-WI-1

**#2343025**

**Limpiador, Desinfectante, Desinfectante de  
Contacto Sin Alimentos, Desodorizante,  
Fungicida, Mildewstat, Virucida \***



### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de emergencia, llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Tenga a mano el envase o etiqueta del producto cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o cuando vaya a un tratamiento.

**SI ESTÁ EN LOS OJOS:** Mantenga abierto el ojo y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Retire las lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos.

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para recibir asesoramiento sobre el tratamiento.

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Traslade a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego dele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** El daño probable de la mucosa puede contraindicar el uso del lavado gástrico.

### INTRUCCIONES



#### **Para uso General, Desinfectante para Hospitales, Fungicida, Virucida \*, Limpiador**

1. Prelimpia las áreas con mucha suciedad.
2. Aplicar una solución de uso de 4 oz. de este producto por 2 galones de agua (o dilución de uso equivalente) para desinfectar superficies duras y no porosas con una esponja, cepillo, trapo, trapeador automático, dispositivo de pulverización mecánica, dispositivo de pulverización de gatillo grueso. Para aplicaciones de rociado, rocíe 6-8 pulgadas de la superficie. No respire el aerosol.
3. Las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 2 minutos para matar el SARS-CoV-2, o 10 minutos para matar todos los organismos enumerados en la etiqueta.
4. Deje que se seque al aire.
5. Prepare una solución fresca diariamente o cuando esté visiblemente sucia.

**Para Fregar.** llene el cubo con 2 galones de agua. Agregue el contenido de un paquete al cubo. Aplicar a las superficies con un paño. Secar

**Para la Limpieza del Piso.** llene el cubo de la fregona con un nivel de 2 galones con agua. Agregue el contenido de un paquete en el cubo de la fregona. Aplique la solución de trapeado al piso. Limpie la solución o el escurridor por el desagüe. Repita y enjuague según sea necesario para eliminar los residuos.



**STEARNS PACKAGING CORPORATION**

4200 Sycamore Avenue (53714) • P.O. Box 14495, Madison, Wisconsin 53708  
Telephone: (800) 655-5008 • (608) 246-5150 • Fax: (608) 246-5149  
E-mail: [stearns@stearnspkg.com](mailto:stearns@stearnspkg.com) • [www.stearnspkg.com](http://www.stearnspkg.com)

Rev. 0923